

Hispanos con VIH en Miami-Dade, 2017

VIH entre hispanos

12,628 (45%)

de las 27,969 personas viviendo con VIH en Miami-Dade en 2017, fueron hispanas


704 (59%)

de las 1,195 personas diagnosticadas con VIH en Miami-Dade en 2017, fueron hispanas

194 (48%)


de las 402 personas diagnosticadas con SIDA en Miami-Dade en 2017, fueron hispanas

Entre los hispanos adultos, los gais y bisexuales representaron la mayor proporción en 2017




Distribución geográfica de hispanos adultos viviendo con VIH al final del 2017


Hispanic



n=12,628




Los hispanos representaron 59% de los casos disagnosticados con VIH en 2017




“Otros” incluyen Asiáticos, Indios Americanos o nativos de Alaska, y razas mixtas.

En el 2017, los hombres hispanos fueron más propensos que las mujeres a ser diagnosticados con VIH




Nuevos casos de VIH por grupo de edades, entre hispanos en Miami-Dade. 2017

La mayor proporción se encuentra entre el grupo de edades 30-39, seguido por el de 20-29



Hispanos viviendo con VIH en Miami-Dade con tratamiento continuo

El tratamiento continuo del VIH, representa una serie de pasos a seguir por la persona que está viviendo con el virus, desde que recibe el diagnóstico inicial, hasta mantener un cuidado médico y tratamiento continuo, con el fin de alcanzar niveles muy bajos del VIH en el cuerpo. A esto se le llama inhibición viral. El riesgo de transmitir el VIH se reduce significativamente cuando el paciente posee una baja carga viral.



27%
de los hispanos
no estaban bajo
tratamiento en el
2017

Bajo Tratamiento: Al menos haber tenido atención médica y tratamiento en el 2017.

Bajo tratamiento continuo: Al menos haber tenido dos o más visitas médicas y tratamientos durante el 2017, con tres meses de diferencia.

Prueba de detección del VIH

Todos los adolescentes y adultos de 13 a 64 años, deben hacerse la prueba del VIH de manera rutinaria, **al menos una vez al año.**

De acuerdo con la legislación de la Florida, toda mujer embarazada debe hacerse la prueba del VIH, al igual que otras pruebas de transmisión sexual, al inicio del cuidado prenatal, y nuevamente durante las semanas 28-32 antes del parto, si no sabe que tiene el virus.

www.knowyourhivstatus.com

Profilaxis preexposición [PrEP]

Las personas que están en alto riesgo de contraer el VIH, tomar diariamente el medicamento **Truvada®**, lo cual puede reducir en 90% la probabilidad de infectarse. Los condones son un medio muy eficaz durante el sexo para prevenir el VIH, y algunas enfermedades de transmisión sexual [ETS]. Las ETS están en aumento en la Florida.

www.prelocator.org

Terapia Antirretroviral [ART]

Para las personas recién diagnosticadas con VIH, comenzar con ART con su proveedor de salud inmediatamente después del diagnóstico, mejora los resultados de salud al prevenir la progresión de la enfermedad reduciendo la carga viral. Para localizar a un proveedor de salud, o conocer más sobre los recursos disponibles para las personas que viven con VIH en Miami-Dade, puede visitar el siguiente sitio:

www.testmiami.org

Línea Directa del VIH/SIDA en la Florida

1-800-FLA-AIDS (352-2437) Inglés

1-800-545-SIDA (545-7432) Español

1-800-AIDS-101 (243-7101) Creole (Haitiano)

1-800-503-7118 Para los que presenten Discapacidades Auditivas y del Habla

Para localizar a un proveedor de salud, o conocer más sobre los recursos disponibles para las personas viviendo con VIH en Florida, visitar: www.floridaaids.org

Fuente: Florida Department of Health. Bureau of Communicable Diseases. HIV/AIDS Section. Epidemiological Profile for Area 11, Miami-Dade County. Datos hasta junio 2018.

