

# 2005

### FLORIDA

### MIAMI-DADE

- Los hispanos representan el 18% del total de la población adulta (13+) de la Florida, el 16% de los 99,509 casos de SIDA y el 18% de los 35,214 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2005.

- Durante el año 2005, los hispanos representaron el 20% de los casos de SIDA entre los hombres y el 14% entre las mujeres.

- Durante el año 2005, los hispanos representaron el 28% de los casos de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres y el 15% entre las mujeres.

- Durante el año 2005, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres hispanos fueron 51.6 y 64.1 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron más del doble que el de los hombres de la raza blanca<sup>1</sup>.

- Durante el año 2005, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 15.4 y 19.2 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron más del triple de probabilidades que las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH<sup>1</sup>.

- Entre los años 2001 y 2004, el porcentaje de casos de SIDA entre adultos permaneció similar cada año, comenzando con un 17% en el 2001 y finalizando con un 17% en el 2004. Sin embargo, por primera vez desde el 2000, se produjo un incremento del 1% entre el 2004 y el 2005 en casos de SIDA entre la población hispana.

- De un total de 1,504 casos pediátricos reportados en la Florida, 120 (8%) corresponden a pediátricos hispanos con SIDA y 51 (14%) a aquellos infectados con VIH.

- Entre los hispanos vivos reportados con VIH/SIDA hasta el 2005, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 67% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 15% y los casos de droga intravenosa con un 13%.

- Entre las hispanas vivas reportadas con VIH/SIDA hasta el 2005, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 83% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 16%.

- Los hispanos representan el 54% del total de la población de Miami-Dade, el 33% de los 29,135 casos de SIDA y el 34% de los 10,486 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2005.

- Durante el año 2005, los hispanos representaron el 38% de los casos de SIDA entre los hombres y el 20% entre las mujeres.

- Durante el año 2005, los hispanos representaron el 43% de los casos de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres y el 26% entre las mujeres.

- Durante el año 2005, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres hispanos fueron 45.5 y 58.4 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron menores que el de los hombres de la raza blanca<sup>1</sup>.

- Durante el año 2005, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 10.4 y 14.7 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron un porcentaje algo más alto que el de las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH<sup>1</sup>.

- Entre los años 2001 y 2003, el porcentaje de casos de SIDA entre adultos disminuyó de un 16% en el 2001 a 14% en el 2003, incrementándose hasta un 19% en el 2004 para descender hasta 17% en el 2005. Sin embargo, el porcentaje de los casos de SIDA entre hispanos permaneció estable en un 16% desde el 2001 hasta el 2004 donde aumento a 19%, disminuyendo en el 2005 a un 16%.

- De un total de 498 casos pediátricos reportados en Miami-Dade, 49 (9.8%) corresponden a pediátricos hispanos con SIDA y 18 (14.5%) a aquellos infectados con VIH.

- Entre los hispanos vivos reportados con VIH/SIDA hasta el 2005, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 68% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 10% y los casos de droga intravenosa con un 5%.

- Entre las hispanas vivas reportadas con VIH/SIDA hasta el 2005, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 69% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 9%.

MIAMI-DADE. CASOS DE SIDA REPORTADOS POR PAISES DE ORIGEN HASTA DICIEMBRE DEL 2005 ENTRE HISPANOS ADULTOS

País de Origen	Hombres teniendo sexo con otros hombres [MSM]		Uso de droga intravenosa [IDU]		[MSM] & [IDU]		Transfusión, Transplante, Hemofilia/Otros		Contacto hetero con personas infectadas		Riesgo no reportado o identificado		Total por columna	
	Cases	%	Cases	%	Cases	%	Cases	&	Cases	%	Cases	&	Cases	%
U.S.A.	550	9.31	198	23.52	62	16.76	13	17.11	181	12.03	78	9.06	1,082	11.31
Puerto Rico	338	5.72	246	29.22	76	20.54	3	3.95	140	9.30	73	8.48	876	9.16
Colombia	283	4.79	17	2.02	16	4.32	5	6.58	64	4.25	29	3.37	414	4.33
Cuba	2,887	48.86	231	27.43	159	42.97	34	44.74	474	31.50	343	39.84	4,128	43.17
Dominican Republic	66	1.12	9	1.07	4	1.08	2	2.63	61	4.05	30	3.48	172	1.80
Honduras	138	2.34	22	2.61	2	0.54	6	7.89	129	8.57	31	3.60	328	3.43
Nicaragua	190	3.22	11	1.31	9	2.43	1	1.32	71	4.72	38	4.41	320	3.35
Otro/Desconocido	1,457	24.66	108	12.83	42	11.35	12	15.79	385	25.58	239	27.76	2,243	23.45
<b>Total</b>	<b>5,909</b>	<b>100%</b>	<b>842</b>	<b>100%</b>	<b>370</b>	<b>100%</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>	<b>1,505</b>	<b>100%</b>	<b>861</b>	<b>100%</b>	<b>9,563</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Población Estimada en 2005, DOH, Office of Planning, Evaluation and Data Analysis  
Fuente: The Florida Department of Health, Bureau of HIV/AIDS

<sup>2</sup> Población Estimada en 2005, U.S. Census Bureau, Census of Population, 1990-2000, Summary File 1. Miami-Dade County Department of Planning and Zoning, Research Section, 2003.  
Fuente: MDCHD-HIV/AIDS Surveillance.