

2006

FLORIDA

MIAMI-DADE

■ Los hispanos representan el 19% del total de la población adulta (13+) de la Florida, el 18% de los 4,949 casos de SIDA y el 20% de los 5,187 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2006.

■ Durante el año 2006, los hispanos representaron el 20% de los casos de SIDA entre los hombres y el 14% entre las mujeres; el 23% de los casos de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres y el 14% entre las mujeres.

■ Durante el año 2006, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres hispanos fueron 47.2 y 56.9 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron más del doble que el de los hombres de la raza blanca.

■ Durante el año 2006, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 14.7 y 15.2 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron más del triple de probabilidades que las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH.

■ Entre los años 1999 y 2006, el porcentaje de casos de VIH entre adultos se incrementó en 13%. Los nuevos casos de VIH entre hombres hispanos aumentó en 21%; sin embargo los nuevos casos de VIH entre las mujeres Hispanas disminuyeron en 10%.

■ De un acumulado total de 2,065 casos pediátricos reportados en la Florida hasta el 2006, 202 (10%) corresponden a casos de VIH/SIDA entre hispanos.

■ Entre los hispanos vivos reportados con VIH/SIDA hasta el 2006, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 69% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 14% y el uso de droga intravenosa con un 11%.

■ Entre las hispanas vivas reportadas con VIH/SIDA hasta el 2006, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 83% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 14%.

■ El VIH fue la cuarta causa de muerte en el 2006 tanto entre hombres como entre mujeres hispanas comprendidas entre las edades de 25-44.

■ Los hispanos representan el 62% del total de la población de Miami-Dade, el 33% de los 30,234 casos de SIDA y el 35% de los 10,816 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2006.

■ Durante el año 2006, los hispanos representaron el 41% de los casos de SIDA entre los hombres y el 21% entre las mujeres.

■ Durante el año 2006, los hispanos representaron el 48% de los casos de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres y el 22% entre las mujeres.

■ Durante el año 2006, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres hispanos fueron 44.0 y 56.2 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron menores que el de los hombres de la raza blanca.

■ Durante el año 2006, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 10.0 y 10.5 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron un porcentaje algo más alto que el de las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH.

■ Entre los años 1999 y 2006, el porcentaje de casos de VIH entre adultos disminuyó de un 5.5%. Los nuevos casos de VIH disminuyeron en 5% entre hispanos hombres y 5% entre mujeres hispanas.

■ Hasta el 2006 se han reportado 51 (10.1%) casos pediátricos de SIDA y 19 (14.5%) de VIH entre hispanos.

■ Entre los hispanos vivos reportados con VIH/SIDA hasta el 2006, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 69% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 10% y el uso de droga intravenosa con un 5%.

■ Entre las hispanas vivas reportadas con VIH/SIDA hasta el 2006, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 74% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 9%.

CASOS DE SIDA REPORTADOS POR PAISES DE ORIGEN EN MIAMI-DADE HASTA DICIEMBRE DEL 2006 ENTRE HISPANOS ADULTOS

País de Origen	Hombres que tienen sexo con hombres {MSM}		Uso de droga Intravenosa [IDU]		[MSM] & [IDU]		Transfusión, Transplante, Hemofilia/Otros		Contacto Heterosexual		Riesgo no Reportado o identificado		Total por fila	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
U.S.A.	603	51.1	206	17.4	69	5.8	16	1.4	211	17.9	76	6.4	1,181	100
Puerto Rico	356	39.0	255	27.9	83	9.1	4	0.4	148	16.2	67	7.3	913	100
Argentina	93	68.9	7	5.2	7	5.2	1	0.7	22	16.3	5	3.7	135	100
Colombia	298	69.1	19	4.4	16	3.7	5	1.2	68	15.8	25	5.8	431	100
Cuba	2,989	70.2	243	5.7	169	4.0	34	0.8	500	11.7	325	7.6	4,260	100
República Dominicana	71	38.6	9	4.9	4	2.2	2	1.1	71	38.6	27	14.7	184	100
Honduras	149	42.5	22	6.3	3	0.9	6	1.7	139	39.6	32	9.1	351	100
México	101	56.1	12	6.7	6	3.3	2	1.1	38	21.1	21	11.7	180	100
Nicaragua	201	60.0	12	3.6	10	3.0	1	0.3	77	23.0	34	10.1	335	100
Peru	113	68.5	3	1.8	1	0.6	0	0.0	35	21.2	13	7.9	165	100
Venezuela	173	84.4	5	2.4	1	0.5	1	0.5	16	7.8	9	4.4	205	100
Otros/Desconocido	1,027	63.2	83	5.1	27	1.7	8	0.5	303	18.6	178	10.9	1,626	100
Total	6,174		876		396		80		1,628		812		9,966	