

FLORIDA

MIAMI-DADE

■ Los hispanos representan el 20% del total de la población adulta (13+) de la Florida, el 18% de los 4,944 casos de SIDA y el 19% de los 7,498 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2008.

■ Durante el año 2008, los hispanos representaron el 20% de los casos de SIDA entre los hombres y el 13% entre las mujeres; el 21% de los casos de VIH (incluyendo aquellos casos convertidos en SIDA) entre los hombres y el 15% entre las mujeres.

■ Durante el año 2008, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (incluyendo aquellos casos convertidos en SIDA) entre los hombres hispanos fueron 43.4 y 72.8 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron más del doble que el de los hombres de la raza blanca.

■ Durante el año 2008, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (incluyendo aquellos casos convertidos en SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 12.0 y 17.8 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron más del triple de probabilidades que las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH.

■ Entre los años 1999 y 2008, el porcentaje de casos de VIH entre adultos se incrementó en 76%. Los nuevos casos de VIH entre hombres hispanos aumentó en 43%; sin embargo los nuevos casos de VIH entre las mujeres Hispanas disminuyeron en 39%.

■ De un acumulado total de 2,254 casos pediátricos reportados en la Florida hasta el 2008, 250 (11%) corresponden a casos de VIH/SIDA entre hispanos.

■ Entre los hispanos vivos reportados con VIH/SIDA hasta el 2008, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 70% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 14% y el uso de droga intravenosa con un 10%.

■ Entre las hispanas vivas reportadas con VIH/SIDA hasta el 2008, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 83% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 14%.

■ Los hispanos representan el 62% del total de la población de Miami-Dade, el 33% de los 31,141 casos de SIDA y el 37% de los 12,297 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2008.

■ Durante el año 2008, los hispanos representaron el 42% de los casos de SIDA entre los hombres y el 19% entre las mujeres.

■ Durante el año 2008, los hispanos representaron el 47% de los casos de VIH (incluyendo aquellos casos convertidos en SIDA) entre los hombres y el 23% entre las mujeres.

■ Durante el año 2008, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (incluyendo aquellos casos convertidos en SIDA) entre los hombres hispanos fueron 44.3 y 72.1 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron menores que el de los hombres de la raza blanca.

■ Durante el año 2008, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (incluyendo aquellos casos convertidos en SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 10.6 y 8.1 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron un porcentaje algo más alto que el de las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH.

■ Entre los años 2000 y 2008, el porcentaje de casos de VIH entre adultos aumentaron 13.6%. Los nuevos casos de VIH aumentaron 26.8% entre hispanos hombres y 2.3% entre mujeres hispanas.

■ Hasta el 2008 se han reportado 51 (10.1%) casos pediátricos de SIDA y 26 (14.7%) de VIH entre hispanos.

■ Entre los hispanos vivos reportados con VIH/SIDA hasta el 2008, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 71.4% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 10.3% y el uso de droga intravenosa con un 4.6%.

■ Entre las hispanas vivas reportadas con VIH/SIDA hasta el 2008, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 76.3% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 8.8%.

CASOS DE SIDA REPORTADOS EN MIAMI-DADE HASTA EL 2008 ENTRE LA POBLACION HISPANA ADULTA														
Pais de Origen	Men who have sex with men [MSM]		Injecting drug use [IDU]		[MSM] & [IDU]		Transfusion, Transplant, Hemoph/Other		Heterosexual contact		Risk not reported or identified [NIR]		Row Total	
	Cases	%	Cases	%	Cases	%	Cases	%	Cases	%	Cases	%	Cases	%
U.S.A.	670	51.3	207	15.8	82	6.3	19	1.5	255	19.5	73	5.6	1,306	100%
Puerto Rico	387	38.9	264	26.6	96	9.7	5	0.5	174	17.5	68	6.8	994	100%
Argentina	108	71.1	7	4.6	7	4.6	0	0.0	26	17.1	4	2.6	152	100%
Colombia	329	70.3	20	4.3	16	3.4	5	1.1	69	14.7	29	6.2	468	100%
Cuba	3,181	70.3	258	5.7	173	3.8	34	0.8	559	12.4	319	7.1	4,524	100%
Dominican Republic	76	38.2	10	5.0	4	2.0	1	0.5	84	42.2	24	12.1	199	100%
Honduras	168	43.4	25	6.5	3	0.8	6	1.6	151	39.0	34	8.8	387	100%
Mexico	120	58.8	15	7.4	6	2.9	1	0.5	41	20.1	21	10.3	204	100%
Nicaragua	223	60.4	12	3.3	12	3.3	1	0.3	86	23.3	35	9.5	369	100%
Peru	119	69.2	3	1.7	1	0.6	0	0.0	35	20.3	14	8.1	172	100%
Venezuela	187	84.6	5	2.3	1	0.5	1	0.5	19	8.6	8	3.6	221	100%
Other/Unknown	1,050	62.9	79	4.7	26	1.6	9	0.5	331	19.8	175	10.5	1,670	100%
Total Hispanos Adultos	6,618	62.0%	905	8.5%	427	4.0%	82	0.8%	1,830	17.2%	804	7.5%	10,666	100%