

VIH/SIDA entre Hispanos

Florida

Miami-Dade

Hasta el 2010 se había reportado en la Florida 98,530 personas viviendo con un diagnóstico de VIH (PLWHA) De ellos, los hispanos representaron:	En Miami-Dade se reportó un total de 25,589 personas viviendo con VIH hasta el 2012. De ellos los hispanos representaron:
20% del total de casos 23% de los hombres & 13% de las mujeres 13% de los casos pediátricos 26% de los casos MSM 18% de los casos de IDU 14% de los casos heterosexuales	41% del total de casos 48% de los hombres & 22% de las mujeres 15% de los casos pediátricos 57% de los casos de MSM 26% de los casos de IDU 25% de los casos heterosexuales
12% de las muertes ocurridas por SIDA 2010	25% de las muertes ocurridas por SIDA en el 2012
Estimados de población de la Florida en el 2010 muestran que: 23% de los floridanos son hispanos	De acuerdo a estimados de población para Miami-Dade en el 2012 65% de los residentes son hispanos.

La proporción de nuevos casos de VIH reportados entre hispanos aumentó de 19% en el 2003, a 23% en el 2012.

La proporción de nuevos casos de VIH reportados entre hispanos aumentó de 40% en el 2003, a 46% en el 2012.

En la Florida, la tasa de infección del VIH en los nuevos casos reportados en el 2012 entre hombres hispanos, fue 2.4 veces mayor que entre los hombres blancos, y la de las mujeres hispanas fue 2.3 veces más alta que la de las blancas.

En Miami-Dade, la tasa de infección del VIH en los nuevos casos reportados en el 2012 entre hombres hispanos, fue 15% menor que entre los hombres blancos, y la de las mujeres hispanas fue 30% menor que la de las blancas.

Entre los adultos, uno de cada 110 hombres hispanos y una de cada 466 mujeres estaban viviendo con VIH/SIDA en el 2012, comparado con uno de cada 192 hombres blancos y una de cada 1,092 mujeres blancas.

Entre los adultos, uno de cada 78 hombres hispanos y una de cada 454 mujeres estaban viviendo con VIH/SIDA en el 2012, comparado con uno de cada 58 hombres blancos y una de cada 445 mujeres blancas.

De los 19,974 hispanos viviendo con un diagnóstico de VIH hasta el 2011, 31% son nacidos en EE.UU., 15% nacieron en Cuba, 10% en Puerto Rico, 5% son de origen mexicano, 28% nacieron en otro país y se desconoce el origen de 11% de ellos.

De los 10,379 hispanos viviendo con un diagnóstico de VIH hasta el 2012, 25% son nacidos en Cuba, 20% nacieron en EE.UU., 5% nacieron en Honduras, 5% en Puerto Rico, 4% son de origen nicaragüense, 26% nacieron en otro país y se desconoce el origen de 15% de ellos.

Pasos para reducir el VIH/SIDA entre la población hispana:

- Incrementar entre los hispanos el conocimiento sobre el VIH y los riesgos relacionados con esta enfermedad.
- Alentar a los hispanos a hacerse la prueba del VIH.
- Si está viviendo con VIH/SIDA, obtener tratamiento y cuidados.
- Involucrar a los jóvenes en la planificación comunitaria sobre el VIH, toma de decisiones y prevención.
- Disminuir las barreras para hacerse la prueba, obtener cuidados de prevención y eliminar los estigmas existentes.
- Diseminar información sobre el beneficio del uso del condón y otras medidas de reducción de riesgos.

Fuente de información:

- *Florida data:* FL Department of Health, Bureau of communicable Disease, HIV/AIDS and Hepatitis Section. For more Florida data go to <http://floridaaids.org/> then trends and statistics. For Miami-Dade go to www.dadehealth.or
- For National facts, go to: <http://www.cdc.gov/hiv/hispanic/resources/factsheets/hispanic.htm> or <http://www.kff.org/hiv/aids/>

