



# VIH ENTRE HISPANOS EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE, 2018

## VIH ENTRE HISPANOS

**13,030 (46%)**

de las **28,345** personas viviendo con VIH en el condado de Miami-Dade en el 2018, fueron hispanas


**725 (59%)**

de las **1,224** personas diagnosticadas con VIH en el condado de Miami-Dade en el 2018, fueron hispanas


**196 (49%)**

de las **402** personas diagnosticadas con SIDA en el condado de Miami-Dade en el 2018, fueron hispanas


Entre los hispanos adultos diagnosticados en el 2018, los gais representaron la mayor proporción



## Distribución geográfica de hispanos adultos viviendo con VIH al final del 2018




Los hispanos representaron 49% de los casos diagnosticados con VIH en el 2018




“Otros” incluyen Asiáticos, Indios Americanos o nativos de Alaska, y razas mixtas.

En el 2018, los hombres hispanos fueron más propensos que las mujeres a ser diagnosticados con VIH




Proporción de nuevos casos de VIH por grupo de edades, entre hispanos en el Condado de Miami-Dade en el 2018



## Hispanos viviendo con VIH en el Condado de Miami-Dade con tratamiento continuo

El tratamiento continuo del VIH, representa una serie de pasos a seguir por la persona que está viviendo con el virus, desde que recibe el diagnóstico inicial, hasta mantener un cuidado médico y tratamiento continuo, con el fin de alcanzar niveles muy bajos del VIH en el cuerpo. A esto se le llama inhibición viral. El riesgo de transmitir el VIH se reduce significativamente cuando el paciente posee una baja carga viral.



**Bajo tratamiento:** Al menos haber tenido atención médica y tratamiento en el 2018

**Bajo tratamiento continuo:** Al menos haber tenido dos o más visitas médicas y tratamiento en el 2018, con tres meses de diferencia.

### Prueba de detección del VIH

Todos los adolescentes y adultos de 13 a 64 años, deben hacerse la prueba del VIH de manera rutinaria, **al menos una vez al año.**

De acuerdo con la legislación de la Florida, toda mujer embarazada debe hacerse la prueba del VIH, al igual que otras pruebas de transmisión sexual, al inicio del cuidado prenatal, y nuevamente durante las semanas 28-32 antes del parto, si no sabe que tiene el virus.

[www.knowyourhivstatus.com](http://www.knowyourhivstatus.com)

### Profilaxis preexposición [PrEP]

Las personas que están en alto riesgo de contraer el VIH, tomar diariamente el medicamento **Truvada®**, lo cual puede reducir en 90% la probabilidad de infectarse. Los condones son un medio muy eficaz durante el sexo para prevenir el VIH, y algunas enfermedades de transmisión sexual [ETS].

Las ETS están en aumento en la Florida.

[www.prelocator.org](http://www.prelocator.org)

### Terapia Antirretroviral [ART]

Para las personas recién diagnosticadas con VIH, comenzar con ART con su proveedor de salud inmediatamente después del diagnóstico, mejora los resultados de salud al prevenir la progresión de la enfermedad reduciendo la carga viral. Para localizar a un proveedor de salud, o conocer más sobre los recursos disponibles para las personas que viven con VIH en Miami-Dade, puede visitar el siguiente sitio:

[www.testmiami.org](http://www.testmiami.org)

### Línea Directa del VIH/SIDA en la Florida

1-800-FLA-AIDS (352-2437) Inglés

1-800-545-SIDA (545-7432) Español

1-800-AIDS-101 (243-7101) Creole (Haitiano)

1-800-503-7118 Para los que presenten Discapacidades Auditivas y del Habla

Para localizar a un proveedor de salud, o conocer más sobre los recursos disponibles para las personas viviendo con VIH en Florida, visitar: [www.floridaaids.org](http://www.floridaaids.org)

Fuente: Florida Department of Health. Bureau of Communicable Diseases. HIV/AIDS Section. Epidemiological Profile for Area 11, Miami-Dade County. Datos hasta junio 2019.

